

GR Γενικές Πληροφορίες

sera costapur • Εφαρμοστικό κατά του *Ichthyophthirius multifiliis* και όλων παρασίτων ψαριών γλυκού και θαλασσινού νερού.

Οδηγίες χρήσης: Ανακινήστε καθά πριν από τη χρήση!

Κανονική δοσολογία: την 1η και 3η ημέρα προσέβατε 22 σπαργόνες ή 1ml για κάθε 40 λίτρα νερού ευημέριου, σε ασφαρές περιπτώσεις επαναλάβετε την 5η και 7η ημέρα.

To sera costapur διατίθενται σε συσκευασίες των 50ml, 100ml και σε φιάλες των 500ml.

Προσοχή! Ως συσκευασίες των 100ml και των 500ml το ακριβότατο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σταγονόμετρα.

Κάτιστε τα φυτά, ανεβάστε ελαφρά την θερμοκρασία και ταυτόχρονα αυξήστε τον αερίσμα του νερού κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας απομακρύνετε τον ανθρώπινο και κλείστε όλους του αποποιητές UV.

Σας προτείνουμε τη φλέρτρικη της θεραπείας. Για να αυξήσετε την αντίσταση στις ασθένειες χρησιμοποιείτε πάντα βιταμίνες sera fishtamin.

SI Navodilo za uporabo

sera costapur • Pripravek za okrasne ribi, deluje proti zajedavcu *Ichthyophthirius multifiliis* in drugim zajedavcem pri sladkovodnih in morskih ribah.

Uporaba: Pred uporabo pretestri!

Normalno doziranje: 1. in 3. dan 1 ml ali 22 kapljic na 40 l akvarijске vode, v težkih primerih postopek 5. in 7. dan ponovimo.

sera costapur dobite v stekleničkah po 50 ml, 100 ml in 500 ml.

Opozorilo: Pri stekleničkah s 100 ml in 500 ml vložek ni primeren za kapalko.

Zdravljenje lahko pospeši z zatemnitvijo akvarija, rahlim vzlanjem temperature in tako, da hkrati prečrakujete akvarij. Med zdravljenjem ne filtrirate preko oglja in izklopite UV-žarnice!

Dva dni po zadnjem doziranju pripravka vam priporočamo, da filtrirate vodo skozi filtrino oglje sera super carbon in delno menjate v vrtbem ribniku vodo. Za večanje odpornosti priporočamo vitaminomsku kuro s pripravkom sera fishtamin.

H Felhasználási információ

sera costapur • Vízelőkészítő diszhalak számára *Ichthyophthirius multifiliis* és más édes- és a tengervizi halakra veszélyes előzőökők ellen.

Használati információ: Használattal előtt felrázandó!

Normál adagolás: Az első és a harmadik napon 1 ml-t, vagy 22 cseppet adagolni 40 l akváriumhez, súlyos esetekben az ötödik és a hetedik napon utánadagolni.

A sera costapur-5 50 ml-es, 100 ml-es és 500 ml-es kiszerelésben kapható.

Figyelem: a 100 ml-es és 500 ml-es üvegeken lévő zárolókuk nem alkalmas csepegtetőnek.

A medence lesötétele és enyhe homéréslekötévelés az egylétrü szellőzetetővel együtt meggyorítsa a gyógyulási folyamatot. A kezelés folyamán nem szabad aktív szemes szírést alkalmazni és az UV-lámpát ki kell kapcsolni!

Az utolsó adagolás után két nappal ajánljuk, hogy szürje át a vizet a sera super carbon-on és hajtson végre részesleg vizcserét. Az ellenállóképesség erősítése érdekében végezzük sera fishtamin-nal vitaminkurát.

PL Informacje o zastosowaniu

sera costapur • Kuracja woda dla ryb ozdobnych przeciwko *Ichthyophthirius multifiliis* i innym pasożytom występującym u ryb słodkowodnych i morskich.

Instrukcja stosowania: Wstrząsnąć przed użyciem!

Zwykle dozowanie: w pierwszym i trzecim dniu dodaj 22 krople lub 1 ml na każe 40 litrów wody w akwarium, w czekających przypadkach zastosuj ponownie piątego i siódmego dnia.

sera costapur jest dostępny w butelkach o pojemności 50 ml, 100 ml i 500 ml.

UWAGI! W pojemnikach 100 ml i 500 ml końcówka wylotowa nie może być używana jako kroplomierz.

Zaciemnienie zbiornika i lekkie podwyższenie temperatury z jednociennym napowietrzaniem przyspiesza proces leczenia. Podczas leczenia usuną filtr węglowy i włącz oświetlenie UV!

Dwa dni po podaniu ostatniej dawki zalecamy filtryację przez SERA super carbon i częstocową podmianę wody. W celu wzrostu odporności na choroby, powinna być przeprowadzona kuracja witaminowa przy pomocy SERA fishtamin.

CZ Informační popis

sera costapur • Léčivo pro okrasné ryby proti *Ichthyophthirius multifiliis* a dalším parazitům sladkovodních i mořských ryb.

Navod k použití: Před použitím zatřepit!

Dávkování: 1. a 3. den 1 ml nebo 22 kapké na 40 l vody v akváriu. V těžších případech 5. a 7. den opakovat.

sera costapur je k dostání v provedení: obsah 50 ml, 100 ml a 500 ml.

Pozor: U balení 100 ml a 500 ml dávkovač nástavce nenahrazuje kapátko!

Zatemnění nádrže a lehké zvýšení teploty při současném provozu urychlí proces léčení. Během lečby nefiltrujte přes aktivní uhlí, vypnout UV-lampu!

Dva dny po posledním dávkovaném doporučujeme filtraci s použitím sera super carbon a častěji novým výměnu vody. Úspěšnou pomocí dokonale rekovalessenci je vitaminová kúra se sera fishtamin. Provedení die navštívit u sera fishtamin.

TR Kullanım bilgileri

sera costapur • Su duzenleyici ilaç, *Ichthyophthirius multifiliis* (beyaz benek hastalığına) ve diğer parazitler karşı tutu su ve tuzlu su balıklarında.

Kullanma talimatı: Kullanmadan önce ılıç calkalayınız!

Normal Doz: 1inci ve 3üncü gün 22 damla veya her 40 litre için 1 ml ekleyin, şiddetli vakalarda 5inci ve 7inci gün doz tekrarlayın.

sera costapur, 50, 100, 500 ml 500 ml sıslarede satılmaktadır.

Dikkat: 100 ml ve 500 ml sıslarede, dozaj damla değil, ml hesabıyla uygulayınız.

Akvaryumu karartmak, hafif bir ıslıktır ve havalandırma işlemini sürecini hızlandırır. Tedavide esnasında kömürlü filtreleme yapmanız ve UV ışıklarını kapatmanız!

Son tedavi bitiminden 5 gün sonra kışımı su değişimini ve direkt sera super carbon ile filtreleme yapmanız öneriz. Hastalıkları karşı dirençlere artırılması için, sera fishtamin ile vitamin kürü uygulanmalıdır.

RUS Инструкция по применению

sera costapur (SERA costapur) • Кондиционер для аквариумной воды против иктиофтириуса и других паразитов у пресноводных и морских рыб.

Указания по применению: Перед применением взболтать!

Оченьная дозировка: Добавлять 1 мл или 22 капли на каждые 40 литров аквариумной воды в 1-ий и 3-ий день. В тяжелых случаях – добавлять также на 5-ий и 7-ой день.

SERA costapur доступен в упаковках 50 ml, 100 ml и 500 ml.

Внимание! В упаковках 100 ml и 500 ml выпускное отверстие не может использоваться в качестве пипетки.

Затемнение аквариума и легкое повышение температуры с одновременной азрацией ускоряют процесс выздоровления. На первом этапе обработки: отключите уф-лампы и не фильтруйте воду через активированный уголь. Через два дня после последней дозировки мы рекомендуем профильтровать воду через SERA super carbon (SERA super carbon) и произвести частичную подмену воды. Для повышения устойчивости рыб к заболеваниям рекомендуется поддерживать их с помощью мультивитаминного препарата SERA fishtamin (SERA fishtamin).

C SERA 治白點劑

SERA 治白點劑 • 在淡水及海水魚缸中對抗白點病和其他寄生蟲的水質治療劑。

使用說明: 使用前請充分的搖晃均勻！

一般使用劑量: 在使用的第一天和第三天，在每 40 公升的魚缸水中加入 1 毫升或是 22 滴治療劑。如果情況嚴重，在第五天和第七天繼續添加相同的劑量。

SERA costapur 有 50 毫升、100 毫升和 500 毫升三種不同容量的瓶裝。

注意: 本產品 100 毫升和 500 毫升瓶裝的仰制管嘴不能被充當成滴管來使用。將魚缸放置在昏暗的環境下，略微提高魚缸溫度，同時給魚缸通氣能加快治療的速度。在治療期間，請移除過濾器中的活性碳並且關閉外線殺菌燈！

在加入最後一次劑量的兩天後，建議您使用 SERA 過濾活性碳來過濾並進行部分換水。為了增強魚隻對疾病的天然抵抗力，還應該添加 SERA 魚用活力維生素劑(魚隻專用維生素)。

RUS Использование

sera costapur (SERA costapur) • Кондиционер для аквариумной воды против иктиофтириуса и других паразитов у пресноводных и морских рыб.

Изъятия по применению: Перед применением взболтать!

Оченьная дозировка: Добавлять 1 мл или 22 капли на каждые 40 литров аквариумной воды в 1-ий и 3-ий день. В тяжелых случаях – добавлять также на 5-ий и 7-ой день.

SERA costapur доступен в упаковках 50 ml, 100 ml и 500 ml.

Внимание! В упаковках 100 ml и 500 ml выпускное отверстие не может использоваться в качестве пипетки.

Затемнение аквариума и легкое повышение температуры с одновременной азрацией ускоряют процесс выздоровления. На первом этапе обработки: отключите уф-лампы и не фильтруйте воду через активированный уголь. Через два дня после последней дозировки мы рекомендуем профильтровать воду через SERA super carbon (SERA super carbon) и произвести частичную подмену воды. Для повышения устойчивости рыб к заболеваниям рекомендуется поддерживать их с помощью мультивитаминного препарата SERA fishtamin (SERA fishtamin).

ROK 사용 설명서

세라 코스터퍼 • 담수와 해수 수조 관상어들의 백점병 및 타 기생충병에 대한 치료제.

사용 안내서: 사용전 혼들여 주세요!

일반적 사용량: 첫째날과 둘째날 수족관물 40 리터 당 1 ml 또는 22 방울, 병이 심한 경우 다섯째날과 일곱째날에 추가 투여한다.

세라 코스터퍼는 50 ml, 100ml, 500ml入り의 병으로 있습니다.

[주의] 100 ml 및 500 ml 병의 경우에는滴式ではありません.

수槽의 조명을 끄고, 온도를少し 높여서 설정하고, 에어레이션을 행하는 경우에는 차단하고, 해수槽은 환기통을 통해 공기 교환을 합니다.

마지막 치료제 투여 후 2~3일 후에는 세라 액티브 카본(sera active carbon)을 사용하여 물을 교체합니다.

마지막 치료제 투여 후 2~3일 후에는 세라 액티브 카본(sera active carbon)을 사용하여 물을 교체합니다.

마지막 치료제 투여 후 2~3일 후에는 세라 액티브 카본(sera active carbon)을 사용하여 물을 교체합니다.

마지막 치료제 투여 후 2~3일 후에는 세라 액티브 카본(sera active carbon)을 사용하여 물을 교체합니다.

마지막 치료제 투여 후 2~3일 후에는 세라 액티브 카본(sera active carbon)을 사용하여 물을 교체합니다.

마지막 치료제 투여 후 2~3일 후에는 세라 액티브 카본(sera active carbon)을 사용하여 물을 교체합니다.

마지막 치료제 투여 후 2~3일 후에는 세라 액티브 카본(sera active carbon)을 사용하여 물을 교체합니다.

마지막 치료제 투여 후 2~3일 후에는 세라 액티브 카본(sera active carbon)을 사용하여 물을 교체합니다.

마지막 치료제 투여 후 2~3일 후에는 세라 액티브 카본(sera active carbon)을 사용하여 물을 교체합니다.

마지막 치료제 투여 후 2~3일 후에는 세라 액티브 카본(sera active carbon)을 사용하여 물을 교체합니다.

마지막 치료제 투여 후 2~3일 후에는 세라 액티브 카본(sera active carbon)을 사용하여 물을 교체합니다.

마지막 치료제 투여 후 2~3일 후에는 세라 액티브 카본(sera active carbon)을 사용하여 물을 교체합니다.

마지막 치료제 투여 후 2~3일 후에는 세라 액티브 카본(sera active carbon)을 사용하여 물을 교체합니다.

마지막 치료제 투여 후 2~3일 후에는 세라 액티브 카본(sera active carbon)을 사용하여 물을 교체합니다.

마지막 치료제 투여 후 2~3일 후에는 세라 액티브 카본(sera active carbon)을 사용하여 물을 교체합니다.

마지막 치료제 투여 후 2~3일 후에는 세라 액티브 카본(sera active carbon)을 사용하여 물을 교체합니다.

마지막 치료제 투여 후 2~3일 후에는 세라 액티브 카본(sera active carbon)을 사용하여 물을 교체합니다.

마지막 치료제 투여 후 2~3일 후에는 세라 액티브 카본(sera active carbon)을 사용하여 물을 교체합니다.

마지막 치료제 투여 후 2~3일 후에는 세라 액티브 카본(sera active carbon)을 사용하여 물을 교체합니다.

마지막 치료제 투여 후 2~3일 후에는 세라 액티브 카본(sera active carbon)을 사용하여 물을 교체합니다.

마지막 치료제 투여 후 2~3일 후에는 세라 액티브 카본(sera active carbon)을 사용하여 물을 교체합니다.

마지막 치료제 투여 후 2~3일 후에는 세라 액티브 카본(sera active carbon)을 사용하여 물을 교체합니다.

마지막 치료제 투여 후 2~3일 후에는 세라 액티브 카본(sera active carbon)을 사용하여 물을 교체합니다.

마지막 치료제 투여 후 2~3일 후에는 세라 액티브 카본(sera active carbon)을 사용하여 물을 교체합니다.

마지막 치료제 투여 후 2~3일 후에는 세라 액티브 카본(sera active carbon)을 사용하여 물을 교체합니다.

마지막 치료제 투여 후 2~3일 후에는 세라 액티브 카본(sera active carbon)을 사용하여 물을 교체합니다.

마지막 치료제 투여 후 2~3일 후에는 세라 액티브 카본(sera active carbon)을 사용하여 물을 교체합니다.

마지막 치료제 투여 후 2~3일 후에는 세라 액티브 카본(sera active carbon)을 사용하여 물을 교체합니다.

마지막 치료제 투여 후 2~3일 후에는 세라 액티브 카본(sera active carbon)을 사용하여 물을 교체합니다.

마지막 치료제 투여 후 2~3일 후에는 세라 액티브 카본(sera active carbon)을 사용하여 물을 교체합니다.

마지막 치료제 투여 후 2~3일 후에는 세라 액티브 카본(sera active carbon)을 사용하여 물을 교체합니다.

마지막 치료제 투여 후 2~3일 후에는 세라 액티브 카본(sera active carbon)을 사용하여 물을 교체합니다.

마지막 치료제 투여 후 2~3일 후에는 세라 액티브 카본(sera active carbon)을 사용하여 물을 교체합니다.

마지막 치료제 투여 후 2~3일 후에는 세라 액티브 카본(sera active carbon)을 사용하여 물을 교체합니다.

마지막 치료제 투여 후 2~3일 후에는 세라 액티브 카본(sera active carbon)을 사용하여 물을 교체합니다.

마지막 치료제 투여 후 2~3일 후에는 세라 액티브 카본(sera active carbon)을 사용하여 물을 교체합니다.

마지막 치료제 투여 후 2~3일 후에는 세라 액티브 카본(sera active carbon)을 사용하여 물을 교체합니다.

마지막 치료제 투여 후 2~3일 후에는 세라 액티브 카본(sera active carbon)을 사용하여 물을 교체합니다.

마지막 치료제 투여 후 2~3일 후에는 세라 액티브 카본(sera active carbon)을 사용하여 물을 교체합니다.

마지막 치료제 투여 후 2~3일 후에는 세라 액티브 카본(sera active carbon)을 사용하여 물을 교체합니다.

마지막 치료제 투여 후 2~3일 후에는 세라 액티브 카본(sera active carbon)을 사용하여 물을 교체합니다.

마지막 치료제 투여 후 2~3일 후에는 세라 액티브 카본(sera active carbon)을 사용하여 물을 교체합니다.

마지막 치료제 투여 후 2~3일 후에는 세라 액티브 카본(sera active carbon)을 사용하여 물을 교체합니다.

마지막 치료제 투여 후 2~3일 후에는 세라 액티브 카본(sera active carbon)을 사용하여 물을 교체합니다.

마지막 치료제 투여 후 2~3일 후에는 세라 액티브 카본(sera active carbon)을 사용하여 물을 교체합니다.

마지막 치료제 투여 후 2~3일 후에는 세라 액티브 카본(sera active carbon)을 사용하여 물을 교체합니다.

마지막 치료제 투여 후 2~3일 후에는 세라 액티브 카본(sera active carbon)을 사용하여 물을 교체합니다.

마지막 치료제 투여 후 2~3일 후에는 세라 액티브 카본(sera active carbon)을 사용하여 물을 교체합니다.

마지막 치료제 투여 후 2~3일 후에는 세라 액티브 카본(sera active carbon)을 사용하여 물을 교체합니다.

마지막 치료제 투여 후 2~3일 후에는 세라 액티브 카본(sera active carbon)을 사용하여 물을 교체합니다.

마지막 치료제 투여 후 2~3일 후에는 세라 액티브 카본(sera active carbon)을 사용하여 물을 교체합니다.

마지막 치료제 투여 후 2~3일 후에는 세라 액티브 카본(sera active carbon)을 사용하여 물을 교체합니다.

마지막 치료제 투여 후 2~3일 후에는 세라 액티브 카본(sera active carbon)을 사용하여 물을 교체합니다.

마지막 치료제 투여 후 2~3일 후에는 세라 액티브 카본(sera active carbon)을 사용하여 물을 교체합니다.

마지막 치료제 투여 후 2~3일 후에는 세라 액티브 카본(sera active carbon)을 사용하여 물을 교체합니다.

마지막 치료제 투여 후 2~3일 후에는 세라 액티브 카본(sera active carbon)을 사용하여 물을 교체합니다.

마지막 치료제 투여 후 2~3일 후에는 세라 액티브 카본(sera active carbon)을 사용하여 물을 교체합니다.

마지막 치료제 투여 후 2~3일 후에는 세라 액티브 카본(sera active carbon)을 사용하여 물을 교체합니다.

마지막 치료제 투여 후 2~3일 후에는 세라 액티브 카본(sera active carbon)을 사용하여 물을 교체합니다.

마지막 치료제 투여 후 2~3일 후에는 세라 액티브 카본(sera active carbon)을 사용하여 물을 교체합니다.

마지막 치료제 투여 후 2~3일 후에는 세라 액티브 카본(sera active carbon)을 사용하여 물을 교체합니다.

마지막 치료제 투여 후 2~3일 후에는 세라 액티브 카본(sera active carbon)을 사용하여 물을 교체합니다.

마지막 치료제 투여 후 2~3일 후에는 세라 액티브 카본(sera active carbon)을 사용하여 물을 교체합니다.

마지막 치료제 투여 후 2~3일 후에는 세라 액티브 카본(sera active carbon)을 사용하여 물을 교체합니다.

마지막 치료제 투여 후 2~3일 후에는 세라 액티브 카본(sera active carbon)을 사용하여 물을 교체합니다.

마지막 치료제 투여 후 2~3일 후에는 세라 액티브 카본(sera active carbon)을 사용하여 물을 교체합니다.